



Laringoscopia / Broncoscopia

Educación para paciente y familia

Esta página de enseñanza contiene información general. Si usted tiene alguna pregunta puede preguntarle a la enfermera en la clínica. Llame a **813-262-1330** para hacer una cita.

Qué es una Laringoscopia o Broncoscopia rígida?

Una laringoscopia y/o rígido broncoscopia es un procedimiento utilizado para mirar en la caja de voz (laringe), tráquea y los conductos de aire (bronquios) en los pulmones. Esto es hecho bajo anestesia general en la sala de operaciones. Instrumentos como laringoscopios y broncoscopio se puede colocar con cuidado a través de la boca y se transmite hacia abajo para evaluar la laringe, la tráquea y en las vías respiratorias grandes de los pulmones. Un telescopio con una cámara con luz se utiliza para ayudar en la evaluación de la enfermedad en esta zona del cuerpo. Una pequeña muestra de tejido (biopsia) o moco se puede tomar durante este procedimiento. Otras intervenciones a menudo se pueden combinar con esta evaluación de la vía aérea cuando se indica como la inyección de medicamentos. (i.e. esteroides anti-inflamatorios) o la dilatación de un estrechamiento de las vías respiratorias con un globo.

Cuanto tiempo tardara en recuperarse?

La mayoría de los niños vuelven a la normalidad dentro de las 24 horas después de la cirugía. Su niño puede quejarse de dolor de garganta o ronquera vocal durante 1-2 días.

Como puedo cuidar de mi niño/na después de la cirugía?

1. **Dieta:**
 - a. Su niño/na podrá comer o beber lo que quiera. Si experimentan dolor de garganta, considera una dieta suave y mucho líquido (no-carbohidratos).
2. **Medicamentos de Dolor:**
 - a. Puede darle medicamento para el dolor (Tylenol o Motrin) cada 4-6 horas si es necesario. Si su niño/na experimenta un dolor severo, por favor llame a nuestra oficina.
3. **Medicamentos para la Fiebre:**
 - a. Una fiebre de bajo grado menos de 101.5 °F puede ocurrir después de la cirugía y puede ser tratado con Tylenol. Si la fiebre persiste por más de 12 horas por favor llamar a nuestra oficina.
4. **Sangrado:**
 - a. No debe haber ningún sangrado de la boca después de que su hijo regrese a casa. Si usted ve algún sangrado, por favor llame a nuestra oficina.
5. **Actividad:**
 - a. Es mejor que su niño descanse en su casa el día de la cirugía. Actividades normales pueden empeorar según su niño/na se sienta cómodo en hacer. No hay una regla para el momento adecuado para volver a la escuela, pero una directriz de 1-2 días.
6. **Respiración:**
 - a. El niño debe estar respirando cómodamente después de la cirugía. Respiración ruidosa, respiración rápida, o el aumento de las vías respiratorias esfuerzo después de la cirugía, por favor llamar al cirujano rápidamente.
7. **Cita después de cirugía:**
 - a. Una cita se debería hacer en nuestra oficina alrededor de 2-3 semanas después de cirugía, si no ha hecho una cita, por favor llamar a nuestra oficina.

Cuando debería llamar al doctor?

Llame a la oficina si su niño/na experimenta:

- Temperatura mas de 101.5° F
- Fiebres persistente mas de 12 horas despues de cirugia
- Sangrado de la nariz o boca
- La respiración ruidosa o con dificultad
- Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo se ve o se siente