



Tympanomastoidectomy

Enfermedades del oído / crónica

Educación para Paciente y la Familia

Esta hoja educativa contiene información general. Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor hable con la enfermera de la oficina al (813) 262-1330.

¿Qué es la enfermedad crónica del oído / colesteatoma?

Enfermedad del oído crónica es causada por alteración de la ventilación de porciones del oído detrás del tímpano (oído medio), también conocidos como disfunción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta el oído a la parte posterior de la nariz y es importante en la igualación de la presión y la promoción de un entorno normal oído sano. Si este sistema funciona mal, la enfermedad crónica del oído puede ocurrir con asociados retracción / debilitamiento del tímpano, infección crónica drenaje (otorrea), pérdida de la audición, o el desarrollo de quistes cutáneos secundarios (colesteatoma) que en última instancia se convierten localmente destructiva a estructuras cercanas importantes como los huesos auditivos frágiles.

¿Qué puede hacerse para la crónica enfermedad del oído / colesteatoma?

Un tympanomastoidectomy es un procedimiento quirúrgico para darle a su hijo un oído limpio, seguro, sano seco que funciona normalmente. El cirujano extirpa el hueso infectado del oído (mastoides) y el tejido blando infectado asociado mientras la reconstrucción de una nueva tímpano sano. Cuando el colesteatoma es grave, un enfoque por etapas (dos cirugías separadas por 6-12 meses) produce los mejores resultados. A veces, una osiculoplastia es necesario cuando los huesos auditivos frágiles se reconstruyen utilizando huesos auditivos prótesis si se dañan del colesteatoma. Después de eliminar el proceso de la enfermedad, el objetivo secundario de la cirugía del oído es mejorar la audiencia a través de la reconstrucción de la cadena de huesecillos.

El procedimiento implica una incisión oculta detrás de la oreja. La mayoría de mastoidectomies mantiene el óseo canal auditivo intacto. Cuando la enfermedad está presente o grave a menudo para los casos de revisión, una variación de este procedimiento incluyen la eliminación de la parte posterior del canal auditivo, la creación de una cavidad ósea que se conecta al conducto auditivo externo (pared del canal hacia abajo mastoidectomía) con una abertura del oído más grande.

Cuánto tiempo tardará en recuperarse?

La cirugía es ambulatoria. Los niños por lo general pueden volver a la escuela en pocos días después de que el apósito se ha bajado y ya no necesitará analgésicos recetados.

¿Cuáles son los riesgos de una tympanomastoidectomy?

Los riesgos de este procedimiento incluyen la falta de curar / reaparecer, sangrado, infección o alteración del gusto temporal. Cualquier cirugía del oído y mastoides teóricamente puede tener un riesgo de dañar la audición, el

equilibrio, la función del nervio facial, o fuga de líquido cefalorraquídeo, pero esto es muy rara (<1%). Un monitor nervio facial se utiliza para seguridad adicional durante toda la operación.

¿Cómo puedo cuidar a mi hijo?

- 1. Dolor:** En el mostrador Tylenol y Motrin son grandes medicamentos para la cirugía de oído. El cirujano de su hijo puede recetar un medicamento de prescripción adicional en ciertos casos.
- 2. Herida Cuidado:** Mantenga aderezo para 24-48hrs después de la operación. La sangre tiñó el drenaje del conducto auditivo o incisión es normal y esperado después de la cirugía de orejas. Coloca un ungüento entregado incisión de 2-3 veces al día durante 7 días. Después de eso, pomada Aquaphor se puede colocar sobre la incisión de 2-3 veces al día hasta después de la operación primera cita. Muchas veces un antibiótico se prescribe en espera de lo que se encuentra en el oído. Las suturas son absorbibles.
- 3. Precauciones Agua:** Coloca una bola de algodón con vaselina en el canal auditivo en la ducha para mantener el oído canal seco. Tirarlo a la basura después de la ducha. No sumerja la herida o la oreja bajo el agua (es decir, bañarse o nadar) hasta que su cirujano lo apreben.
- 4. Cita post-Op:** Una cita de seguimiento debe hacerse en nuestra oficina durante 3 semanas después de la cirugía. Nos vemos de nuevo posteriormente aproximadamente 3 meses después de la cirugía y la prueba de audición de su hijo. A menudo, el cirujano tendrá a su hijo en gotas para los oídos para ser iniciado hace 1 semana antes de la segunda visita a la clínica.